Topiramát

Přehled přípravků, pro které platí uvedené doporučení:
Topamax tbl flm
Topilex tbl flm
Topimark tbl flm
Topiramat Actavis tbl flm
Topiramate Viatris tbl flm
Topiramat Sandoz tbl flm

Substance:
Topiramát

Léková forma:
Tableta, potahovaná, s okamžitým uvolňováním účinné látky

Upozornění pro lékaře:
- Podání přípravku sondou je postupem off-label!

POSTUP PŘI PODÁNÍ SONDOU

- Úpravu léčiva provádějte těsně před podáním do sondy!
- Zvláštní léková forma (tableta se speciální úpravou) – je nezbytné pečlivě dodržet níže uvedený postup, aby se minimalizovalo riziko okluze sondy a rozklad/degradace léčiva!
- U pacientů, u kterých je sledována bilance tekutin, započítejte množství vody použité na přípravu léčiva a proplachy sondy do celkového denního příjmu tekutin!
- Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu topiramátu – těhotné ženy nebo ženy plánující těhotenství by proto měly při úpravě léčiva používat standardní osobní ochranné prostředky!

Postup při podání sondou do žaludku:

1. Přerušte podávání výživy.
2. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
3. Umístěte tabletu do misky a tloučkem ji rozdrťte na jemný prach.
4. Přidejte do misky 10 ml převařené vody pokojové teploty a promíchejte.
5. Vzniklou suspenzi natáhněte do injekční stříkačky.
6. Protřepejte suspenzi léčiva ve stříkačce a podejte ji do sondy.
7. Natáhněte do stejné stříkačky znovu 10 ml převařené vody pokojové teploty a podejte je do sondy.
8. Propláchněte sondu 15 ml převařené vody pokojové teploty.
9. Obnovte podávání výživy.

Postup při podání sondou do duodena/jejuna:

1. Postupujte stejným způsobem jako při podání sondou do žaludku.

Autor: Mgr. Barbora Brezinová, Ph.D., Mgr. Tomáš Topolčány, Mgr. Agáta Dušková

Aktualizace: 1. 8. 2026